

## 양액농도에 따른 *Phalaenopsis* 생육 및 무기성분 함량

양상호<sup>1\*</sup> · 송민옥<sup>2</sup> · 허태현<sup>1</sup> · 성문석<sup>1</sup> · 박영철<sup>1</sup> · 김용철<sup>1</sup> · 소인섭<sup>2</sup> · 강훈<sup>2</sup>

<sup>1</sup>제주도농업기술원, <sup>2</sup>제주대학교 생명자원과학대학 생물산업학부

### Effect of Nutrient Solution Strengths on Growth and Mineral Content of *Phalaenopsis* under the closed Ebb and Flow System

Sang Ho Yang<sup>1\*</sup>, Min Ock Song<sup>2</sup>, Tae Hyun Hur<sup>1</sup>, Mun Seok Seong<sup>1</sup>, Young Chul Park<sup>1</sup>, Yong Chol Kim<sup>1</sup>, In Sup So<sup>2</sup>, and Hoon Kang<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Jeju-do Agricultural Research & Extension Services, Yeon-Dong 313-80, Korea

<sup>2</sup>Faculty of Bioscience and Industry, Cheju National University, Ara-Dong 1, Korea

#### ABSTRACT

This study was conducted to clarify the optimum nutrient solution concentration for *Phalaenopsis* cultivation. Plants were cultivated in the closed ebb and flow system. The nutrient solution for *Phalaenopsis* developed in NHRI(National Horticultural Research Institute) in 1994 was divided into 4 groups according to the strength of solutions: 1, 2, 3, and 4 times of NHRI for the experiment. The solution of one time showed better growth status compared to those of the 2, 3 and 4 times treatments, showing 4 leaves, 13 roots, 29.0 g of fresh weight, low T/R ratio and low plant death ratio. EC fluctuations were much more varied in higher strengths compared to lower EC levels but pH were more stable compared to EC fluctuations at the early stage, however decreased rapidly as progressing

supply times. The contents of N and P were higher in higher position leaves than in low position leaves, but not different from those in phyllotaxis and root. There was a trend that Mn content in roots was 3 to 5 times higher than that of leaves, but Fe, Cu, Zn content showed the reversed trends. Generally, cultivation in 1 time strength(EC 0.5 dS·m<sup>-1</sup>) showed superior growth status as well as reduced salinization in medium. So this indicates that cultivation in the one time strength is better way to cultivate a higher quality *Phalaenopsis*.

**Key word:** *Phalaenopsis*, subirrigation, nutrient solution selection

#### 서 론

*Phalaenopsis* 속은 약 50여종이 동남아시아를 중심으로 태국, 베트남, 인도, 호주 북부, 필리핀, 대만 및 중국 남부 등의 고온 다습한 지역에서 자생하고 있다(Kim, 1999). 이러한 팔레놉시스는 단경성(單莖性)의 착생란으로 잎이 두껍고 다육질이며,

Corresponding Author: Sang Ho Yang, Jeju-do Agricultural Reserch & Extension Services,  
Yeon-Dong 313-80, Korea  
Tel : 064)710-0552, E-mail : [yangsaho@hanmail.net](mailto:yangsaho@hanmail.net)

뿌리는 굵은 끈과 같은 모양을 지니고 있다(Endo와 Ikusima, 1989). 그리고 팔레놉시스 속을 이용한 인위적인 교배로 인하여 다른 속도 만들어지고 있는 데, 이중 Iwasaki에 의하여 *Doritis*와 *Phalaenopsis*의 속간 교배로 육성되어 첫 등록된 교잡종은 *Doritaenopsis 'Ashi'*이다. 최근에는 팔레놉시스 육종 기술의 발달로 기존의 분홍, 노랑색 외에 반점, 줄무늬, 흰색 꽃잎에 적색 순변이 있는 것 등 다양한 화색을 띤 품종들이 육성되어지고 있다(Arditti와 Ernst, 1993).

팔레놉시스의 개화 시기는 주로 2~3월에 집중되고 있지만 최근에는 품종들이 다양해지고 개화 조절에 관한 연구가 활발히 이루어져 거의 주년 생산이 가능하게 되었다. 꽃이 화려하고 개화 기간이 길며 절화나 분화의 형태로 이용할 수 있기 때문에 소비자들에게 인기가 높을 뿐만 아니라 소비 형태 또한 다양해져서 꽃의 생산 및 소비 수요가 급증하고 있다(Griesbach, 1995; Sinoda, 1994). 미국 시장에서는 매년 600만주씩 소비되어 왔고 최근에는 중국, 미국, 일본, 캐나다, 유럽 등 여러 지역에서 그 소비가 점차 늘어나고 있다. 또한 부가가치가 높은 고품질의 팔레놉시스를 생산하기 위해 수경재배 방식을 비롯하여 시비법 개발에 관한 연구가 활발히 수행되어지고 있다 (Gething, 1997; Ichihashi, 1982; Kubata와 Yoneda, 1990).

양액은 수경 재배에서 가장 중요한 요소 중의 하나로서 작물 및 품종별 양액의 조성과 농도의 합리적인 관리 여부에 따라서 재배의 성패를 좌우하는 요인이 되고 있다. 전(2003) 등은 고품질의 *Pelargonium*을 생산하기 위해서는 수경 재배시 재배 환경에 적합한 생육 단계별 양액 조성의 개발이 매우 중요하며, 재배 기간 중 작물의 양분 흡수 특성에 일치시키기 위한 양액 내 이온의 조성과 농도는 그 변화가 작기 때문에 고품질의 *Pelargonium* 생산이 가능하고 비료의 낭비가 적어 경제성이 향상된다고 하였으며, Poole와 Seeley (1978)는 생육을 향상시키기 위해서는 비교적 높은 농도의 비료를 필요로 한다고 하였다.

양액은 식물의 종류나 생육 단계 및 환경 조건, 그리고 관수 방법이나 배지의 종류에 따라 생장에 미치는 영향이 다르므로 주어진 조건에 맞추어 농도를 알

맞게 조절해 주어야 한다. 저면관수시스템을 이용하여 양액 농도 조건을 달리하여 *Doritaenopsis*를 재배하는 경우, 양액 농도가 높을수록 화경 발생율과 화경 길이 및 소화수가 감소하였고, 특히 높은 농도 처리구에서는 뿌리 부패로 인한 고사율이 40%에 달하였다. 또한 배양액의 농도를 표준으로 공급하였을 때 양액의 pH와 EC가 비교적 안정되었고 식물체의 전물중이 증가하였으며 고사율도 낮아 표준 배양액 농도가 팔레놉시스 생장에 가장 적절하다고 하였다(Choi 등, 2002).

저면관수법은 식물체에 물리적인 자극을 주지 않으면서 생장에 필요한 양분과 수분을 근원부에 공급하는 방법이므로 기존의 상위 관수법에 비해 50% 이상 비료를 절약할 수 있으며, 꽃이나 잎에 수분이 묻지 않아 다습시 발생하는 병충해를 줄일 수 있어 고품질의 팔레놉시스를 생산할 수 있다고 하였다 (Reed, 1996). 반면 저면관수시스템은 지하부를 통해 양·수분이 공급되므로 비료염의 용탈이 이루어지지 않기 때문에 비료를 과용하면 염류 집적으로 인한 염류 장해 현상이 일어날 수 있다고 하였다 (Choi와 Lee, 1995; van Iersen, 1999). 그러므로 고품질의 팔레놉시스를 생산하기 위해서는 재배법 개선이 이루어져야 한다. 수경 재배는 일반 토양 재배에 비하여 토양의 완충 능력이 없기 때문에 정확한 양액의 조성 및 관리가 매우 중요하다.

따라서 본 연구는 팔레놉시스의 품질 향상을 위하여 저면관수시스템에 요구되는 영양생장기에 알맞은 생육 단계별 적정 양액의 농도 파악하고 팔레놉시스의 생육 및 무기성분 함량에 미치는 영향을 검토하고자 수행하였다.

## 재료 및 방법

### 식물재료

본 시험에 사용된 시험 재료는 Zumacanyon사(미국)에서 육성된 품종을 2000년도에 도입하여 제주도농업기술원에서 2001년 4월에 교배한 후 생산된 실생 플러그묘(Phal. Timothy Christopher × Phal. Zuma's pixies 'Nagoya #8')로서 2002년 11월부터 2003년 6월까지 7개월 동안 순화 재배한 묘를 사용하였다.

### 수경재배 시스템

저면관수시스템(Ebb & Flow System)은 저면 관수용 플라보드를 이용한 시스템으로 가로 1,170

mm, 세로 4,900 mm 크기로 성형품을 사용하였으며, 양액은 자동제어시스템으로 공급 및 배출 되도록 하였다(Fig. 1).





Fig. 1. Schematic diagram of the ebb & flow system used in the experiment.

### 양액조성

필레늄시스의 양액은 Table 1에서 보는 바와 같이 양액 조성표에 따라 '94원시 표준양액(EC 0.5 dS · m<sup>-1</sup>)을 기준으로 1배, 2배, 3배, 4배 농도의 4처리로 조성하였다. 저장 양액은 A, B액으로 나누어서 100배의 농축액으로 조제하여 시험전에 A, B

액을 각각 2.5 ℥씩을 양액통에 첨가하고 수돗물을 넣어 1,000 ℥가 되도록 하였다. 이때의 EC (Electrical Conductivity) 농도는 각각 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 dS · m<sup>-1</sup> 이였고, pH는 0.5 N-HCl(0.5 Normal-Hydrochloric Acid)을 이용하여 pH 5.5 수준으로 조절하였다.

Table 1. Nutrient solution composition used in the experiment for *Phalaenopsis* culture.

Nutrient solution	Fertilizer (g/1000 ℥)	Concentration of nutrient solution (times) <sup>y)</sup>			
		1 <sup>x)</sup>	2	3	4
Macro Element	A solution	Ca(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> · 4H <sub>2</sub> O	118.1	236.1	354.2
		KNO <sub>3</sub>	151.7	303.3	455.0
		CaCl <sub>2</sub> · 2H <sub>2</sub> O	73.5	147.0	220.5
	B solution	NH <sub>4</sub> NO <sub>3</sub>	40.0	80.1	120.1
		NH <sub>4</sub> H <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	57.5	115.0	172.5
		MgSO <sub>4</sub> · 7H <sub>2</sub> O	61.6	123.3	185.0
Micro Element	A solution	Fe-EDTA	3.8~6.3	7.5~12.5	11.3~18.7
		MnSO <sub>4</sub> · H <sub>2</sub> O	0.5~0.8	1~1.5	1.5~2.3
		ZnSO <sub>4</sub> · 7H <sub>2</sub> O	0.5~0.8	1~1.5	1.5~2.3
	B solution	CuSO <sub>4</sub> · 5H <sub>2</sub> O	0.013	0.025	0.038
		H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub>	0.06	0.11	0.17
		Na <sub>2</sub> MoO <sub>4</sub> · 2H <sub>2</sub> O	0.005	0.01	0.015

<sup>x)</sup>Supplied fertilizers of 1(EC 0.5 dS · m<sup>-1</sup>), 2(EC 1.0 dS · m<sup>-1</sup>), 3(EC 1.5 dS · m<sup>-1</sup>), 4(EC 0.5 dS · m<sup>-1</sup>) times by basic standard nutrient solution for *Phalaenopsis* recommended by '94. National Horiticultural Research Institute.

<sup>y)</sup>Standard nutrient solution for *Phalaenopsis* recommended by '94. National Horiticultural Research Institute.

## 재배방법 및 환경

팔레놉시스의 재배는 직경 16 cm의 비닐포트 밀 바닥에 약간의 수태를 깔고 그 위에 7개월 순화재배 된 실생 플러그묘를 올려놓는 최소배지 재배방법을 이용하였으며, 5개월 동안 저면관수법으로 양액을 순환 공급하면서 재배하였다. 유리온실 내부의 기상 환경은 최저온도 25±2°C, 최고온도 30±2°C로 유지하였다.

## 시험처리

팔레놉시스 원시표준양액(EC 0.5 dS·m<sup>-1</sup>)의 1배, 2배, 3배, 4배의 농도로 하여 4처리로 나누고 양액의 공급 주기는 12일마다 1회, 공급 시간은 1시간씩 8차까지 공급하였다. 양액 공급 시 양액의 높이는 화분 밀바닥에서 2 cm 정도 높이까지 잠겨 지도록 하였다.

## 조사 및 분석

### 1) 생육 특성

2003 6부터 11까지 5개월 동안 재배 후 농촌진흥청 원예연구소 화훼육종기술 육종체계 및 조사기준에 의하여 생육특성을 조사하였다. 시험 성적의 산출, 계산 및 통계분석은 sas 통계프로그램을 이용하였다.

### 2) 양액 중의 pH 및 EC

2003년 6월부터 양액의 공급 주기는 12일마다 1회, 공급 시간은 1시간씩 8차까지 공급까지 양액 공급 후 다음 날 채취하여 pH 및 EC를 pH-EC meter (TOAKK, WM-22EP)로 측정하였다.

### 3) 식물체 무기성분 분석

2003 6부터 11까지 5개월 동안 양액 공급 후의 식물체 10주를 한 집단으로 묶어서 식물체 부위별로 채취하여 수돗물로 씻고 증류수로 행군 후 60°C 전조기(dry oven)에서 3~4일 동안 전조하였다. 전조된 시료는 분쇄하여 시료 1 g을 정확히 취하여 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>으로 습식 분해하였다. 총 질소 함량은 분해액 20 mL를 취하여 Kjeldahl 증류법에 따라 증류 후 0.05 N-H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>(0.05 Normal-Sulfuric Acid)액으로 적정하여 총 질소 함량을

분석하였다. 다량원소와 미량원소의 함량은 유도결합 플라즈마 원자방출분광계(ICP, JY 70C)를 이용하여 분석하였다.

## 결과 및 고찰

### 생육특성

엽수, 엽장 및 엽폭은 원시표준 양액농도 1배 액(EC 0.5 dS·m<sup>-1</sup>) 처리에서는 4.1개, 9.8 cm, 5.4 cm로 2배액(EC 1.0 dS·m<sup>-1</sup>) 처리의 3.9개, 9.3 cm, 5.7 cm와 유의성이 없었지만 4배액(EC 2.0 dS·m<sup>-1</sup>) 처리에서는 3.1개, 6.8 cm, 4.5 cm를 보여 처리간에 유의성이 인정되었고, 농도가 높을수록 엽수, 엽장 및 엽폭이 감소하였다(Table 2, Fig. 2).

뿌리수는 1배액 처리에서 13.1개와 2배액 처리의 12.6개 사이에는 유의성이 없었지만 3배액(EC 1.5 dS·m<sup>-1</sup>) 처리에서는 8.4개, 4배액 처리에서는 7.4개로 농도가 증가할수록 뿌리수가 감소하였고, 뿌리길이는 1배액 처리에서는 12.2 cm이었지만 4배액 처리에서는 11.3 cm로 농도가 증가할수록 저조하였다. Endo와 Sugi(1992)는 팔레놉시스의 양액 재배시 고농도의 양액에서는 뿌리의 부패가 많았다고 하였는데, 본 실험에서도 양액의 농도가 증가할수록 뿌리수가 적어지고 부패가 많아 생육이 저조하였다. 최 등(2002)도 *Doritaenopsis* 묘를 9개월 동안 재배한 시험에서 뿌리수는 저농도 처리구 0.9 dS·m<sup>-1</sup>와 1.4 dS·m<sup>-1</sup>에서 가장 많았다고 하였다.

생체중은 1배액 처리에서 29.8 g, 2배액 처리에서 28.7 g, 3배액 처리에서 22.7 g, 4배액 처리에서 15.9 g으로 농도가 높을수록 감소하였으며, T/R률은 생체중의 경우와 반대로 증가하는 경향이었다(Table 2). 정 등(1997)은 양액 재배시 덴파례를 70일 동안 양액 재배하였을 때 생체중은 저농도에서 생장이 높았다고 하였는데, 이것은 장기간 높은 농도의 양액으로 재배함으로써 배지에 많은 염류가 집적되어 뿌리에 생리 장해가 발생한 결과라고 하였다.

Table 2. Effect of nutrient solution concentration on the growth of *Phalaenopsis* grown in closed cultivated under the ebb & flow system at 5 months after planting.

Nutrient solution concentration (times) <sup>z)</sup>	No. of leaves	Leaf length (cm)	Leaf width (cm)	No. of Root	Root length (cm)	Fresh wt. (g/plant)	T/R ratio
1 <sup>y)</sup>	4.1a <sup>x)</sup>	9.8a	5.4a	13.1a	12.2a	29.8a	1.49a
2	3.9a	9.3a	5.7a	12.6a	11.5b	28.7a	1.55b
3	3.8a	9.6a	5.0ab	8.4b	11.7b	22.7b	2.02c
4	3.1b	6.8b	4.5b	7.4b	11.3b	15.9c	2.57c

<sup>z)</sup>, <sup>y)</sup>See Table 1.

<sup>x)</sup>Mean separation within columns by Duncan's multiple range test at 5% level.

<sup>w)</sup>Plants were cultivated from June to October 2003 by ebb and flow system culture.




Fig. 2. Comparison of *Phalaenopsis* seedlings growth status as affected nutrient solution concentration treatment at 5 months after planting.

<sup>z)</sup>See Table 1.

<sup>w)</sup>Plants were cultivated from June to October 2003 by ebb and flow system culture.

## 고사율

식물체 고사율은 1배액, 2배액, 3배액, 4배액 순으로 각각 5, 10, 50 및 80% 내외로 나타나 양액의 농도가 높을수록 급격히 증가하였으며 (Fig. 3). 최 등(2002)도 *Doritaenopsis*의 고사율은 EC 0.9, 1.4, 1.9, 2.4 dS·m<sup>-1</sup> 순으로 점진적으로 높아져 각각 0, 2.5, 5.8 및 19.0%를 나타내었다고 하였다.

원시표준양액의 3배액과 4배액의 고농도 처리에서는 양액 공급 2개월 후부터 뿌리가 말라 고사하고

하위엽이 황화되면서 떨어지는 현상이 나타났으며, 양액 공급 4~5개월로 접어들면서 고사율이 급격히 증가하였다 (Fig. 3). 또한, 고농도 양액에서 재배된 식물체는 재배 초기에 포트 밑부분과 배지 윗부분에 하얀 염류 증상이 나타남과 동시에 뿌리 끝부분부터 고사하며 재배 중기에 일 선단부로부터 갈변되면서 하위엽부터 낙엽이 지며, 결국은 식물체가 고사하게 되었다고 하였는데, 본 실험의 경우도 이와 유사한 결과를 나타내었다. 장기간 고농도 양액 공급으로 염류 장해에 의한 뿌리 고사 및 양분 흡수 저조로 생장이 억제된 것으로 생각되었다.




Fig. 3. Effect on percent of death of *Phalaenopsis* as affected by nutrient solution concentration treatment at 5 months after planting.

<sup>2)</sup>See Table 1.

<sup>3)</sup>Plants were cultivated from June to October 2003 by ebb and flow system culture.

## 양액중의 pH 및 EC의 변화

### 1) pH의 변화

양액 중의 pH를 조사한 결과 Fig. 4에서 보는 바와 같이 저농도 처리에서 3차 공급까지 pH가 5.5에서 5.9 정도로 다소 높아졌다. 최 등(2002)도 초기에 pH가 높아지는 경향이 저농도 처리인 EC 0.9 dS·m<sup>-1</sup>와 1.4 dS·m<sup>-1</sup>에서 그 폭이 커다고 하였으나, 본 실험에서는 이보다 농도가 더 낮은 1배액(EC 0.5 dS·m<sup>-1</sup>) 처리에서 pH가 상승하였다. 재배 초기에 pH가 높아지는 것은 영양 생

장기에 NO<sub>3</sub><sup>-</sup>, H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub><sup>-</sup> 및 Cl<sup>-</sup> 등 음이온이 Ca<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup> 및 K<sup>+</sup> 등 양이온보다 흡수가 더 잘 되었기 때문에 pH가 높아진다고 하였다(최 등, 2002). 또한, 식물체가 음이온을 흡수하게 되면 OH<sup>-</sup> 및 HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> 음이온을 방출하고, 양이온을 흡수하게 되면 H<sup>+</sup> 이온을 방출하기 때문에 pH가 변하게 된다고 하였다(Schwarz, 1995).

2, 3 및 4배액 처리인 경우는 2차 공급까지 pH가 5.4 수준으로 거의 일정하였으며, 3차 공급 후에 pH가 4.5 정도로 급격히 낮아졌고 그 후 pH는 거의 일정하거나 다소 낮아지는 경향이었다.

Schwarz (1995)은 pH가 다소 안정화된다는 것은 영양 생장기에 음이온과 양이온이 균형있게 흡수 된다는 것을 의미한다고 하였다. 또한, 저농도에서는 4차 공급, 고농도에서는 3차공급 후 pH가 급격

히 낮아졌으며 고농도 일수록 pH변화의 폭이 커는데 토마토(Choi 등, 1998)와 국화(Kang 등, 1995) 양액 재배에서도 고농도 양액에서 pH 변화가 커다고 하였다.




Fig. 4. The fluctuation of pH as affected by the irrigation times during the experiment.

<sup>z</sup>See Table 1.

<sup>y</sup>The pH was measured right after every irrigation and solutions were supplied 8 times during the experiment.

<sup>x</sup>pH was adjusted at 5.5 by 0.5N HCl at starting point.

<sup>w</sup>Plants were cultivated from June to October 2003 by ebb and flow system culture.

## 2) EC의 변화

양액 중의 EC는 Fig. 5에서 보는 바와 같이 8차 순환 공급까지 양액의 농도 1, 2, 3, 및 4배액 모두가 다소 조금씩 높아졌다. 양액 중의 EC는 시비 기준에 매우 중요한 결정적인 요인인데, 그 이유는 배지가 직접 식물의 뿌리와 접하고 있기 때문이다. 따라서 EC는 재배 환경에 의해 크게 영향 받기 때문에 같은 비료의 농도라도 기온이 높을 때(Kang 와 van Iersel, 2001), 상위 관수보다 저면 관수에서 높아지며(Cox, 2001; Yelanich와 Biernbaum, 1990) 관수 후 배수량(Ku 와 Hershey, 1991)이나 배지의 종류(Klock-Moore 와 Broschat, 2001; van Iersel, 1999)에 따라

서도 달라진다고 하였다.

최 등(2002)도 양액 중의 EC는 초기와 중기에는 비교적 안정되었으나 공급 말기에는 증가하는 경향을 나타내며, 고농도인 EC 2.4 dS · m<sup>-1</sup> 처리에서 가장 많이 증가한다고 하였으나, 본 실험의 결과에서는 농도에 관계없이 공급 초기부터 EC가 서서히 증가하였다. 이것은 양액 공급 시마다 식물체가 양액 중의 양분을 이용하는 양보다 배지 및 베드에 집적되었던 수용성 음이온 및 양이온 양분이 녹아 나오는 양이 많고 식물체를 통한 수분 증산과 베드 또는 화분에서의 수분이 증발함에 따라 양액 중의 EC가 서서히 증가하는 것으로 생각되었다.




Fig. 5. The fluctuation of EC as affected by the irrigation times during the experiment.

<sup>z)</sup>See Table 1.

<sup>y)</sup>The pH was measured right after every irrigation and solutions were supplied 8 times during the experiment.

<sup>x)</sup>pH was adjusted at 5.5 by 0.5N HCl at starting point.

<sup>w)</sup>Plants were cultivated from June to October 2003 by ebb and flow system culture.

### 식물체 무기성분의 함량

#### 1) 다량원소 흡수특성

양액 순환 공급에 따른 EC 농도별 다량원소 함량은 Fig. 6에서 보는 바와 같이 엽중 N과 P의 함량은 상위엽에서가 하위엽보다 높았으나, 엽부위별 함량은 양액 농도별 처리구간에서는 서로 비슷하였다. 뿌리 중의 N의 함량은 2엽과 비슷하였으나 P의 함량은 최상엽인 1엽보다 2배 이상 높았다.

엽중 K의 함량은 저농도인 1배액 처리에서는 상위엽인 1엽과 2엽에서가 함량이 많았으며, 고농도인 4배액 처리에서는 하위엽으로 갈수록 높았다. 뿌리 중의 K의 함량은 엽중 함량보다 낮았으나 양액 농도가 높을수록 다소 높아지는 경향이었다. K는 흡수 속도가 빠르고 이동성이 크며 영양 생장 기간 동안 가장 많이 흡수되는 양분이나 Ca, Mg 및 Na 등과 길항 작용으로 흡수가 억제되어 양액의 농도가 높을수록 하위엽에서 많이 집적되는 것으로 생각되었다. 최 등(2002)은 K의 함량이 난의 종류에 상관없이 높게 나타난 것은 다른 식물보다 내건성이 강한 난과 식물의 삼투조절 기능이 큰 역할을 하기 때문이라고 하였으며, Poole과 Seeley(1978)도 착생란

인 *Phalaenopsis*의 경우에는 K의 함량은 N의 함량보다 3~4배 높다고 하였으나, 본 실험에서는 엽중 K의 함량은 N의 함량 범위와 비슷하였다.

엽중 Mg의 함량은 양액 농도별 모든 처리구에서 하위엽으로 갈수록 높았으며, 엽 부위별 함량은 양액 농도가 낮을수록 높아지는 경향이었다. 또한 뿌리 중의 Mg의 함량은 1엽과 2엽 중의 함량과 비슷하였으나, 1과 2배액 처리에서보다 3과 4배액 처리에서가 높았다. Mg인 경우는 Ca와 K보다 적게 흡수되는 편이고 Mg의 흡수는 K, Ca 및 Mn 등과 길항 작용에 의한 영향 때문에 양액의 농도가 높을수록 하위엽으로 집적되는 것으로 생각되었다.

엽중 Ca의 함량은 저농도인 1배액 처리에서는 하위엽으로 갈수록 다소 감소하였으나, 고농도인 4배액 처리에서는 하위엽으로 갈수록 증가하였다. 또한, 뿌리 중의 Ca의 함량은 엽보다 다소 낮았으나 1과 2배액 처리에서보다 3과 4배액 처리에서가 Ca의 함량이 높았다.

엽중 Na의 함량은 양액 농도별 모든 처리에서 하위엽으로 갈수록 높았으며, 엽 부위별 함량은 1과 2배액 처리에서 높았으며, 뿌리 중의 Na의 함량은 엽중의 1엽과 2엽에서 비슷한 경향이었다(Fig. 6).




Fig. 6. Comparison of macro ion concentration as phyllotaxis and root by nutrient solution concentration treatment by ebb and flow system culture at 5 months after planting.

▨ 1 time<sup>z</sup>, □ 2 times, ■ 3 times, ▨ 4 times.

<sup>z)</sup> See Table 1.

## 2) 미량원소 흡수특성

양액 순환 공급에 따른 EC 농도 및 엽 부위별 미량원소의 함량은 Fig. 7에서 보는 바와 같이 엽 중 Mn의 함량은 뿌리보다 약 3~5배 이상 높았으며, 하위엽으로 갈수록 증가하였다. Mn의 흡수율은 Ca와 Mg 같은 2가 양이온보다는 낮은 편이나 질

소의 형태에 따라서 달라지며 일반적으로  $\text{NO}_3^-$ 를 사용한 경우가 Mn의 흡수가 많아진다. 또한, Mn의 이동성은 식물체 안에서는 비교적 좋지는 않지만 주로 분열조직 쪽으로 이동되어 어린 기관에 많이 함유하기 때문에 엽 중 Mn의 함량은 뿌리보다 높은 것으로 생각되었다.

Fe, Cu, Zn의 함량은 엽보다 뿌리에서 훨씬 높았고, 뿌리 중의 Fe 및 Zn의 함량은 농도가 높은 3과 4배액 처리에서 높은 경향이었다. 엽중의 Fe와 Cu의 함량은 저농도인 1배액 처리에서가 높았다.

Cu는 식물이 흡수하는 양은 매우 적고 체내 이동성이 좋은 편은 아니나 Cu의 영양 상태(농도)에 크게 의존되며 뿌리의 교환 부위로부터 대부분의 다른 이온종과 치환될 수 있기 때문에 엽보다 뿌리에서가 Cu의 함량이 높은 것으로 생각되었다. 또한, Cu는 특히 Zn, Cu, Fe, Mn과 그 외 Mg, Ca 등과의 길항 작용으로 흡수가 억제되고, Fe는 Mn, Cu, Ca, Mg, K, Zn과의 길항 작용 및  $\text{NO}_3^-$ 의 공급시

에 흡수가 억제되기 때문에 양액의 농도가 높을수록 이와 같은 양분의 농도가 높아져 엽에서의 함량이 감소하는 것으로 생각된다. Fe는 식물체 내에서 쉽게 이동하지 않기 때문에 Fe의 함량은 뿌리에서 높은 것으로 생각된다. 또한 뿌리에서 Fe와 Zn의 함량이 양액의 농도가 높을수록 증가하는 것은 흡수된 Fe와 Zn이 체내로 이동이 잘 되지 않고 뿌리에 계속 축적되기 때문인 것으로 생각되었다.

Zn은 체내 이동성은 좋지 않지만 저온이나 호흡 저해의 영향을 받지 않는 교환 현상으로 흡수하기 때문에 엽보다 뿌리에서가 높은 것으로 생각된다.




Fig. 7. Comparison of micro ion concentration as phyllotaxis and root by nutrient solution concentration treatment by ebb and flow system culture at 5 months after planting.

■ 1 time<sup>z)</sup>, □ 2 times, ■ 3 times, ▨ 4 times.

<sup>z)</sup>See Table 1.

## 요 약

저면관수시스템을 이용한 팔레놉시스의 생육에 알맞은 적정 양액 농도를 선발하기 위하여 '94원시 표준양액(EC 0.5 dS·m<sup>-1</sup>)의 1, 2, 3, 및 4배 농도의 비료량을 추가하여 4등급으로 나누어서 5개월 동안 공급하여 재배한 후에 묘의 생육과 식물체 무기성분 함량 변화에 미치는 영향에 관해서 조사하였다.

표준 양액의 1배액 처리구의 경우 엽수는 4.1장, 뿌리수는 13.1개로 2, 3, 및 4배액 처리보다 많았고, 생체중도 29.8 g으로 높았으며, 고사율 및 T/R율이 낮아 생육이 가장 양호하였다. 엽 부위별 N, P의 함량은 양액농도의 증가에 따른 모든 처리에서 상위엽에서가 하위엽보다 높았으나 처리구간에는 비슷하였다. K의 함량은 1배액 처리에서는 상위 엽에서가, 4배액 처리에서는 하위엽에서가 높은 경향이었다. 엽중 Mn의 함량은 뿌리보다 약 3~5배 이상 높았으며, Fe, Cu, Zn의 함량은 엽보다 뿌리에서 많은 경향이었다. 이상의 결과 양액의 농도는 생육이 양호한 1배액(EC 0.5 dS·m<sup>-1</sup>) 수준에서 재배하는 것이 최소배지 내의 염류 집적을 줄이면서 고품질 팔레놉시스를 생산할 수 있을 것으로 생각되었다.

## 참 고 문 헌

- Arditti, J. and R. Ernst. 1993. *Micropropagation of orchids*. p. 373~375 John Wilcy and Sons, Inc., New York.
- Bailey, D. A. and T. Bilderback. 1997. Alkalinity control for irrigation water used in nurseries and greenhouses. Horticulture Information Leaflet 558. North Carolina Coop. Ext. Ser.
- Choi, J. M. and C. W. Lee. 1995. Effects of irrigation methods, nutrient concentrations, and media on salt accumulation in media, growth, and flowering of Easter lilies. J. Kor. Soc. Hort. Sci. 36: 715~724.
- Choi, E. Y., Y. B. Lee, and J. K. Kim. 1998. Development of optimal nutrient solution for tomato substrate culture in closed system. J. Bio. Fac. Env. 7: 43~54.
- Choi, H. K., S. M. Park and C. S. Jeong. 2002. Comparison of quality changes in soil and hydroponic cultured muskmelon fruits. J. Kor. Soc. Hort. Sci. 42: 264~270.
- 최영일, 한은주, 박현춘, 이용범, 백기엽. 2002. Ebb & Flow 시스템을 이용한 *Doritaenopsis 'Tinny Tender'* 양액재배시 생장에 미치는 배양액 농도의 영향. 한국원예학회지 43(1): 86~90.
- Cox, D. A. 2001. Growth nutrient content and growth medium electrical conductivity of poinsettia irrigated by subirrigation or from overhead. J. Plant Nutr. 24: 523~533.
- Endo, M. and I. Ikushima 1989. Diurnal rhythm and characteristics of photosynthesis and respiration in the leaf and root of a *Phalaenopsis* plant. Plant Cell Physiol. 30: 43~47
- Endo, M. and Y. Sugi. 1992. Growth and nutrient adsorption of hydroponic *Phalaenopsis* during a year. Hort. Abstr. 61(2): 532~533.
- Gething, P. A. 1977. The effect of fertilizers on the growth of orchid (*Odontoglossum*) seedlings. Expl. Hort. 29: 94~101.
- Griesbach, R. J. 1995. A phalaenopsis in every pot. Orchid Dig. 59(1): 42~43.
- Ichihashi, S. 1982. Study on fertilization for orchid plants. Composition of fertilization for raising seedlings. J. Japan. Soc. Hort. Sci. p. 428~429. (Abstr.)
- 전민화, 한은주, 백기엽. 2003. Ebb & flood 관수 시스템을 이용한 *Pelargonium hortorum*

- 'Pinto White' 와 'Pinto Pink' 의 분화 생  
산 시 배양액의 농도가 식물체의 생육에 미치는  
영향. 한국원예학회지 44: 518~522.
- 정순주, 이범선, 안규빈. 1997. 양액재배를 이용한  
난의 유묘생산기간의 단축 및 품질향상 기술개  
발 -시스템 및 양액농도가 *Dendrobium*  
*phalaenopsis*의 생장과 품질에 미치는 영향.  
대산회록 5: 21~24
- Kang, J. G., B. S. See, and S. J. Chung.  
1995. Effect of nutrient concentration  
on growth and development of  
aeroponically grown *Chrysanthemum*.  
J. Kor. Soc. Hort. Sic. 36: 83~89.
- Kim, T. J. 1999. Effect of fertilizers, low  
temperature, photosynthetic photon  
flux and growth regulators on growth  
and flowering in *Phalaenopsis*. Ph. D.  
thesis. Graduate School of Chungbuk  
National University, Cheongju.
- Klock-Moore, K. A. and T. K. Broschat.  
2001. Irrigation systems and fertilizer  
affect petunia growth. HortTechnology  
11: 416~418
- Ku, C. S. M. and D. R. Hershey. 1991.  
Leachate electrical conductivity and  
growth of potted poinsettia with  
leaching fractions of 0 to 0.4. J.  
Amer. Soc. Hort. Sci. 116: 802~806.
- Kubata, S. and K. Yoneda. 1990. Effects  
of temperature and fertilization on  
growth and nutrient uptake of  
*Phalaenopsis*. J. Japan. Soc. Hort.  
Sci. 59: 554~555
- Marshner, H 1989. Mineral nutrition of  
higher plants. p. 265~309. Academic  
Press, London.
- Paek, K. Y. and E. C. Yeung. 1991. The  
effect of 1-naphthaleneacetic acid and  
N<sup>6</sup>-benzyladenine on the grow of  
*Cymbidium* forrestiirhizomes in vitro.  
Plant Cell, Tissue and Organ Culture  
24: 65~71.
- Poole, H. A. and J. G. Seeley. 1978.  
Nitrogen, potassium, and maganesium  
nutrition of three orchid genera. J.  
Amer. Soc. Hort. Sci. 103: 485~488.
- Reed, D. W. 1996. Closed production  
systems for containerized crops:  
Recirculating subirrigation and  
zero-leach systems. p 221~245. In:  
D.W. Reed (ed). Water, media, and  
nutrition for greenhouse crops. Ball  
Publ., Batavia, IL, USA.
- Schwarz, M. 1995. Soilless culture  
management. Springer Verlag, Ber-lin,  
Germany.
- Sinoda, K. 1994. Orchid. p. 161~165. In:  
K. Konishi, S. Iwahori, H. Kitagawa,  
and T. Yakuwa (eds.). Horticulture in  
Japan. Asakura Pub-lishing Co.,  
Tokyo, Japan.
- 송성준, 부창호, 유장걸. 1999. 서양 심비디움 양액  
재배에서의 무기물 흡수. 한국환경농학회지  
18: 35~40.
- van Eysinga, J. P. N. L. R. 1980.  
Nutritional disorder in chrysanthemums.  
p. 9~10.
- van Iersel, M. 1999. Fertilizer concentration  
affects growth and nutrient composition  
of subirrigated pansies. HortScience  
34: 660~663.
- Yelanich, M. V. and J. A. Biernbaum  
1990. Effect of fertilizer concentration  
and method of application on media  
nutrient concentration, nitrogen runoff  
and growth of *Euphorbia pulcherrima*  
'V-14 Glory.' Acta Hort. 272: 185~189.
- Zheng, X. N., Z. Q. Wen, R. C. Pan, and  
C. S. Hew. 1992. Response of  
*Cymbidium sinense* to drought stress.  
J. Hort. Sci. 67: 295~299.